

Malalties de l'aparell digestiu

MP2- Atenció sanitària

UF3- Suport en la ingesta i l'eliminació


Llista de malalties de l'aparell digestiu

- Malalties aparell digestiu:

1. Gastroenteritis.
2. Úlcera gàstrica o pèptica
3. Síndrome del còlon irritable.
4. Hepatitis i la icterícia
5. Cirrosis hepàtica
6. Malaltia de Crohn i colitis ulcerosa
7. Càncer colorectal (i els seus tractaments)
8. Càncer d'estómac o gàstric
9. Colelitiasis (pedres a la vesícula biliar)
10. Pancreatitis (aguda o crònica)
11. Diverticulitis

Gastritis o gastroenteritis


És la inflamació de la mucosa gàstrica



Principalment causada per virus, però poden existir altres motius, com alguns aliments irritants o medicació

Úlcera gàstrica (pèptica)

Erosió i/o perforació de la paret interior de l'estómac




Causada per *helicobacter pylori*
(bactèria patògena)

Provoca forts dolors, vòmits
sanguinolents (hematèmesi) i
melenes (presència de sang a la
femta).
En fases avançades pot arribar a
l'hemorràgia interna i la mort.

Síndrome del còlon irritable.

És un trastorn funcional que es caracteritza per un increment dels moviments peristàltics del còlon. Acostuma a aparèixer abans dels 35 anys.

Irritable bowel syndrome (IBS)




Causa multifactorial i encara desconeguda. És creu que pot tenir relació amb estrès i altres factors genètics.

Provoca dolors abdominals i episodis de diarrea (o inclús alguns de restrenyiment)


Colitis ulcerosa

- Inflamació de l'intestí gros, les causes poden ser infeccions o autoimmunes.



Colitis ulcerosa i malaltia de crohn

- Inflamació de l'intestí gros (colitis), o tot el tub digestiu, especialment l'intestí prim (Cron) les causes poden ser infeccions o autoimmunes.



DIFERENCIAS ENTRE HEPATITIS A, B Y C

Comparten síntomas e incluso un mismo nombre, pero las diferencias entre las hepatitis A, B y C son muy notables. Aquí te explicamos cuales son:

A

TRANSMISIÓN POR CONTACTO CON HECES

No suele ser mortal, pero puede provocar insuficiencia hepática aguda, que si tiene alto riesgo de mortalidad. Es curable.

CONTAGIO

- CONSUMIR ALIMENTOS O AGUA CONTAMINADA.
- NO LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER O PREPARAR ALIMENTOS.

B

TRANSMISIÓN POR CONTACTO CON SANGRE

Riesgo de muerte elevado por cirrosis o cáncer. Existen diferentes tipos de vacunas recomendadas. 90% de pacientes se curan.

CONTAGIO

- TRANSMISIÓN PERINATAL
- TRANSMISIÓN SEXUAL.
- USO DE AGUJAS CONTAMINADAS.

C

TRANSMISIÓN POR CONTACTO CON SANGRE

Riesgo de muerte elevado por cirrosis o cáncer, es mortal si no se trata. No existe vacuna. Afecta al 2% de la población. Es curable.

CONTAGIO

- TRANSMISIÓN PERINATAL
- TRANSMISIÓN SEXUAL.
- USO DE AGUJAS CONTAMINADAS.

Cirrosi hepàtica

- Malaltia crònica del fetge que consisteix en la mort progressiva del teixit hepàtic normal. El fetge es torna incapaç de depurar toxines i per tant acaba produint la mort.



Alguns símptomes:

Icterícia


Acòlia

Dolor abdominal

Vòmits amb sang (hematèmesi)

Colelitiasis o litiasis biliar

- És la formació de càlculs (pedres) a la vesícula biliar. Es caracteritza per dolors molt intensos pocs minuts després de menjar. El tractament és l'extirpació de la vesícula biliar.



Alguns símptomes:

Icterícia

Acòlia


Dolor abdominal

Esteatorrea



Diverticulitis




- Al revestiment intern dels intestins, principalment al gros (còlon), s'hi poden formar diverticles (petites bosses). Una vegada formades, és fàcil que petits trossos de matèria fecal hi quedin atrapats, provocant greus inflamacions i infeccions.



Causes força desconegudes, però sembla ser que el baix consum de fibra ho pot propiciar.


Pancreatitis

- És una inflamació del pàncrees, que pot ser passatgera o causar un dany permanent, en funció de si la pancreatitis és aguda o crònica.




Càncer gàstric o d'estómac

- Tumor de caràcter maligne que pot originar-se a qualsevol part de l'estómac. A l'inici acostuma a cursar asimptomàticament o amb molèsties entre els tres i els cinc primers anys.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Càncer colorectal

- En el càncer de còlon i recte les cèl·lules tumorals es localitzen a la part final de l'intestí gros.

