

MP06

ANÀLISI ESTÈTICA

CFGM
ESTÈTICA I
BELLESA



MP06: Anàlisi Estètica
CFGM D'Estètica i Bellesa

Alteracions de la pell.

4.- ALTERACIONS CUTÀNIES AMB REPERCUSSIÓ EN LES TÈCNIQUES ESTÈTIQUES.

Alteracions que s'han de tenir en compte en l'anàlisi estètic.

➤ Alteracions de la **hidratació**.

- **Pell seca:** Les causes són diverses:

Factors ambientals: exposició al sol, vent, fred, aire condicionat o calefacció.

Hàbits de vida: falta de líquid en la dieta, tabac i alcohol.

Factors químics: ús de sabons, aigües calcàries, detergents, etc.

Factors interns: trastorns renals, hormonals, edat.

Alteracions de la pell.

Manca d'elements del Factor Hidratant Natural.

Factors genètics: pèrdua d'aigua per alteració de l'estrat corni .

- **Pell hiperhidratada:** Normalment per alteracions hormonals que incideixen sobre les glàndules sebàcies i sudorípares.



Pell seca



Pell hiperhidratada

Alteracions de la pell.

➤ Alteracions de la sudoració.

• Alteracions estructurals:

✓ **Adenomes**: tumors epitelials benignes. Hi ha diversos tipus:

Hidroadenomas de les parpelles: prominències que apareixen gairebé sempre en l'angle intern.



Hidroadenomes eruptius: petites erupcions a la part superior del pit.



Alteracions de la pell.

Hidrocistomes: quists amb líquid, durs, derivats de les glàndules sudorípares. Solen afectar nas, parpelles, galtes i front. Es veuen més amb la calor.



✓ **Hidrosadenitis**: «golondrinos».

Infecció bacteriana de les glàndules apocrines, normalment a les aixelles



Alteracions de la pell.

- Alteracions del procés de la sudoració :

- ✓ Alteracions quantitatives:

Hiperhidrosi: Excesiva producció de suor. Pot estar originada medicaments o alteracions de les glàndules.

Miliaria. Erupció amb inflamació i pruíja per la retenció de la suor.



Hiperhidrosis.



Miliaria

Alteracions de la pell.

✓ Alteracions qualitatives:

Pseudocromhidrosis: suor pigmentat. Taca la roba.

Cromhidrosis. coloració groguenca, blavosa o verdosa de la suor. A les aixelles o a la part superior de la cara.

Bromhidrosis: suor amb olor per bacteris i pH de la pell. A les aixelles i les plantes dels peus.



Pseudocromhidrosi

Cromhidrosi



Bromhidrosi



Alteracions de la pell.


➤ Alteracions de la lipidació:

Alteració del sèu de l'emulsió epicutània.

Alipia: origina pell seca per falta de contingut lipídic i al no retenir aigua normalment en l'epidermis.



Acne. Alteració dels fol·licles pilosebàcics. Es poden trobar barbs tancats (grànuls de punta blanca) i oberts (punts negres).



Acné.

Alteracions de la pell.

Seborrea. L'emulsió epicutània s'altera per l'augment de la secreció sebàcia i de la composició química del sèu. Es noten més a la cara, front, nas, pòmuls, mentó i esquena. També afecta el cuir cabellut. Produïda per alteració dels andrògens (hormones sexuals masculines).



Seborrea.

Alteracions de la pell.

L'acne es desencadena per:

- ✓ **Anomalías en la queratinización de los corneocitos**

S'acumulen corneòcits per causa del ciment intercel·lular i actuen com un tap i el greix s'acumula per sota.

- ✓ **Secreció sebàcia alterada per excés.** Modificació d'alguns components del sèu. L'excés d'aquests sèu dilata el conducte pilosebaci.

- ✓ **Intervenció microbiana.** Contribueix a la inflamació.

Alteracions de la pell.

➤ Alteracions de la pigmentació:

Alteracions en la producció de melanina.

✓ **Hipercromies:** producció de melanina en excés.

• **Efèlides o pigues.** Màcules petites, d'origen genètic. El sol aavoreix l'aparició de més.



Alteracions de la pell.

- **Nevus:** Acumulació de cèl·lules hiperpigmentades a l'epidermis.



- **Lentigens** : Màcula llisa, de color marró clar, de mida variable però d'un diàmetre màxim de 2 cm. Es troben a la cara i el dors de les mans. D'origen genètic, exposició solar o envelliment.



Alteracions de la pell.

- **Melasma:** Taques a la cara, per causa del sol o hormonal (dones embarassades). A vegades per causa de tiroides.
- **Fotosensibilització:** Causada per alguna substància i posterior exposició al sol.



Alteracions de la pell.

✓ **Acromies:** producció de poca melanina.

• **Vitiligen.** Mort dels melanòcits en algunes zones del cos.



• **Albinisme.** És genètic, per per inactivitat o absència de tirosina. Afecta algunes zones o en tot el cos.



Alteracions de la pell.

➤ Alteracions estètiques de la queratinització:

Alteracions de l'epidermis.

- **Ictiosi.** És congènita. Estrat corni gruixut, amb escates fines i seques.




- **Queratosi actínica.** precancerosa. Taques que es tornen aspres i es cobreixen d'escates. A la cara, dors de les mans. En persones calbes, en el cuir cabellut.



Alteracions de la pell.

- **Berrugues.** Víriques. Són com calls i creixen cap a l'interior. Fan mal.



- **Calls.** Pell endurida i grossa. Produïda per freds continus. Als palmells de les mans i les plantes dels peus.



Alteracions de la pell.

- **Éczema.** Queratosi escamosa amb pruija, sequedat i aparició de fissures i esquerdes. Associat a dermatitis, reaccions irritatives o al·lèrgiques.



- **Psoriasi.** Plaques cobertes d'escates, en colzes i genolls. Pot ser causa de conjunció de factors genètics i ambientals o psicosocial.



Alteracions de la pell.


- **Quists epidèrmics:** Millium. Boletes blanques petites, freqüents en nounats, però també ho poden tenir els adults.



Alteracions de la pell.

2.- ALTERACIONS DE LA QUANTITAT DEL SISTEMA PILOSO.

- **Hipertricosi.** Creixement excessiu del borbissol en les extremitats, cap i esquena. Quan és congènita i/o hormonal cobreix tot el cos es denomina “**síndrome de l'home llop**”. Alguns medicaments poden afectar.
- **Hirsutisme.** És una hipertricosi femenina. Pot ser causa d'excés d'andrògens o defecte d'estrògens. També ho poden causar medicaments hormonals.



Mercès per la vostra atenció

Fí de la presentació

MP06: Anàlisi Estètica
CFGM D'Estètica i Bellesa